

Tabla 5. *Rhinantho mediterranei*-*Trisetum flavescens* Vigo 1984

Inventario	PI0117	PI0114	PI0115	PI0116	PI0173	PI0174	PI0170	
N.º de orden	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[Sin]
Altitud (m)	1150	1220	1230	1180	1450	1430	1450	
Orientación	-	W	W	SW	S	S	W	
Inclinación (°)	-	5	5	10	<5	<5	5	
Cobertura total (%)	100	100	100	100	100	100	100	
Altura herbáceo (cm)	100	100	-	80	-	-	-	
Área (m²)	40	16	15	16	36	70	50	
Características de asociación, alianza y orden								
<i>Arrhenatherum elatius</i>	1.2	3.3	4.3	4.3	3.3	3.3	3.3	V
<i>Taraxacum officinale</i>	.	+	+	.	1.1	+	+	IV
<i>Trifolium repens repens</i>	3.3	1.2	5.4	1.2	.	.	.	III
<i>Phleum pratense bertolonii</i>	2.2	.	.	.	1.2	1.1	1.1	III
<i>Rhinanthus pumilus</i>	+2	2.2	2.2	.	.	.	.	III
<i>Trisetum flavescens</i>	4.4	1.2	.	.	.	.	.	II
<i>Leucanthemum vulgare pujiulae</i>	+	.	.	+	.	.	.	II
<i>Bellis perennis</i>	.	+	.	+	.	.	.	II
Características de clase								
<i>Dactylis glomerata</i>	3.2	3.3	3.3	3.3	3.2	1.2	.	V
<i>Trifolium pratense pratense</i>	4.3	3.2	2.2	4.4	1.2	.	2.2	V
<i>Vicia cracca</i>	3.2	1.2	+2	.	+	1.1	1.1	V
<i>Poa pratensis</i>	.	2.2	2.2	.	1.2	1.2	2.2	IV
<i>Ranunculus acris despectus</i>	3.2	1.1	+	2.2	.	.	.	III
<i>Holcus lanatus</i>	.	1.2	2.2	2.3	.	.	.	III
<i>Rumex acetosa acetosa</i>	+	.	.	1.2	.	.	.	II
Características de <i>Festuco-Brometea</i>								
<i>Onobrychis viciifolia</i>	+2	+	1.2	2.2	.	.	.	III
<i>Galium verum verum</i>	.	.	+	+	1.1	2.2	3.2	IV
<i>Bromus erectus erectus</i>	.	.	.	.	2.2	3.3	5.5	III
<i>Ranunculus bulbosus</i>	.	.	.	.	4.3	4.3	4.4	III
<i>Plantago media</i>	.	.	.	.	3.2	3.2	2.2	III
<i>Centaurea scabiosa scabiosa</i>	.	.	.	.	4.3	3.2	+	III
<i>Trifolium montanum montanum</i>	.	.	.	.	2.2	1.2	+	III
<i>Euphrasia stricta pectinata</i>	.	.	.	.	1.2	2.1	3.2	III
<i>Veronica austriaca teucrium</i>	.	.	.	.	+	+	+	III
Acompañantes								
<i>Lotus corniculatus</i>	2.2	2.2	1.1	1.2	1.2	2.2	1.2	V
<i>Achillea millefolium</i>	.	1.1	1.1	+	1.2	1.2	2.2	V
<i>Plantago lanceolata</i>	.	3.2	2.2	1.1	1.2	2.2	2.2	V
<i>Muscari comosum</i>	.	+	+	.	1.1	+	+	IV
<i>Centaurea collina</i>	.	1.1	1.1	+	.	.	.	III
<i>Veronica arvensis</i>	.	2.2	1.2	+	.	.	.	III
<i>Cerastium arvense</i>	.	2.2	.	+	.	.	+	III
<i>Echium vulgare</i>	.	.	.	.	+	+	+	III
<i>Bromus hordeaceus hordeaceus</i>	.	3.3	+	.	.	.	.	II
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	.	.	+	+	.	.	.	II
<i>Geranium columbinum</i>	.	.	.	.	.	1.2	+	II
<i>Dianthus deltoides deltoides</i>	.	.	.	.	.	+	+	II

**Características de orden y clase con presencia inferior a 2:** *Agrostis capillaris* en 1(1.2); *Crepis biennis* (ord.) en 1; *Festuca pratensis pratensis* en 1(3.3); *Galium mollugo* (ord.) en 1(4.3); *Poa trivialis trivialis* en 1; *Rumex cf. conglomeratus* en 3; *Tragopogon lamottei* (ord.) en 1(2.1).

**Acompañantes con presencia inferior a 2:** *Arabis hirsuta* en 4; *Capsella bursa-pastoris* en 2; *Carex ovalis* en 5; *Centaurea nigra nigra* en 4; *Cerastium pumilum* en 2; *Chaerophyllum aureum* en 1(1.2); *Deschampsia flexuosa flexuosa* en 4(1.2); *Euphorbia cyparissias* en 6(1.2); *Festuca gr. rubra* en 1; *Hypericum perforatum perforatum* en 5; *Lolium perenne* en 2(2.2); *Luzula multiflora* en 1; *Potentilla argentea* en 5; *Pteridium aquilinum* en 4; *Silene latifolia* en 3(1.2); *Silene vulgaris* en 1(1.2); *Stachys recta recta* en 6; *Stellaria media* en 2; *Tanacetum corymbosum corymbosum* en 6; *Viola tricolor arvensis* en 6.

#### Localidades:

- [PI0117]: P. Bielsa, El Plan, BH6924, 28-VI-2000, JLB, 280600A
- [PI0114]: O. Torla, Andecastieto, bajo el Parador, YN3726, 17-VI-1998, JLB, 170698A
- [PI0115]: O. Torla, Andecastieto, junto al Parador, YN3727, 17-VI-1998, JLB, 170698B
- [PI0116]: O. Torla, Andecastieto, carretera de Ordesa km 6, YN3826, 17-VI-1998, JLB, 170698C
- [PI0173]: O. Torla, Bordas de Salarons, YN3926, 24-VI-1998, JLB, 240698A
- [PI0174]: O. Torla, Bordas de Salarons, YN3926, 24-VI-1998, JLB, 240698E
- [PI0170]: O. Torla, Bordas de Salarons, YN4026, 24-VI-1998, JLB, 240698H